

## 隱翅蟲的危害與防治

隱翅蟲是最常見小甲蟲，有毒隱翅蟲的典型種類是蟻型隱翅蟲；此蟲只有一公分長左右，頭、翅鞘及腹末呈黑色，其餘部份則呈橘紅色，乍看之下，宛如大螞蟻一般。牠們生活草叢之間，也常見於稻叢基部；牠們不咬人，也不噬人，但每當除草，割稻期間，由於棲息場所遭破壞，會到處活動。入夜則飛至燈下，如住家無紗窗，此蟲便會登堂入室。

當人熟睡時，頸部及鼠蹊等處，便會覺得癢而伸手搔癢，在搔抓時往往會傷及此蟲，於是其體液內所含的隱翅蟲素(paederin)會塗佈皮膚而引起潰瘍，亦可能引起過敏反應，造成帶狀水泡傷痕，患處會覺紅腫、灼痛。

在民間，原以為此種症狀係高腳蜘蛛「撒尿」所引起的，其實是此蟲為害所造成的。據稱，如果隱翅蟲糞進入人眼，便會引起結膜炎。因此，如發現此蟲，應小心！



勿使其體液沾及皮膚；同時應做紗門、紗窗，以減少此蟲因光誘而進入屋內之機會。

不過如遭此蟲為害，應清洗傷口，拭乾之後在患部塗敷石碳酸氧化鋅軟膏，如症狀嚴重，則內服抗組織胺類藥劑，或注射消炎針劑。

一般，隱翅蟲引起之帶狀水泡症狀大約會持續一週左右才能痊癒，患者應忍勿躁，稍事休息。