

## 「非職業暴露愛滋病毒後預防性投藥」之說明

經國外研究證實，

對於針扎接觸或男男間性行為者於事後使用預防性投藥，

可降低 80% 感染愛滋病毒 ( HIV ) 的機率。

但預防性投藥仍會有藥物副作用，若隨意中斷服藥，

也可能產生抗藥性，故不宜濫用。

國內有 41 家愛滋病指定醫院提供預防性投藥服務。

對於非職業暴露愛滋病毒者，或有暴露愛滋病毒感染風險者，

可於暴露後 72 小時內，至前述醫院由醫療人員進行評估，

並依評估結果決定是否需預防性投藥，一般建議服藥期程為 28 天，

該項服務目前皆為自費，

一個療程所需的費用約在 20,000 至 30,000 元之間。

民眾如有需要，可至疾病管制署全球資訊網(<http://www.cdc.gov.tw/>)，

或撥國內免付費疫情關懷專線 1922 洽詢。

## 「非職業暴露愛滋病毒後預防性投藥」之醫院名單

臺北市	臺北榮民總醫院
	臺北醫學大學附設醫院
	新光醫療社團法人新光吳火獅紀念醫院
	臺北市立聯合醫院陽明院區
	臺北市立聯合醫院昆明院區
	台北馬偕紀念醫院
	台北長庚醫院
新北市	衛生福利部雙和醫院
	馬偕紀念醫院淡水院區
	醫療財團法人徐元智先生醫療基金會亞東紀念醫院
基隆市	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院
宜蘭縣	財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院
桃園縣	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院
	衛生福利部桃園醫院
新竹市	財團法人台灣基督教長老教會馬偕醫院新竹分院
苗栗縣	財團法人為恭紀念醫院
臺中市	中國醫藥大學附設醫院
	中山醫藥大學附設醫院
	林新醫療社團法人林新醫院
	財團法人佛教慈濟綜合醫院台中分院
	澄清綜合醫院中港分院
	童綜合醫療社團法人童綜合紀念醫院
彰化縣	財團法人彰化基督教醫院
	衛生福利部彰化醫院
南投縣	衛生福利部南投醫院
雲林縣	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院
嘉義市	臺中榮民總醫院嘉義分院
	戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院

嘉義縣	嘉義長庚醫院
台南市	奇美醫療財團法人奇美醫院
	國立成功大學醫學院附設醫院
高雄市	義大醫療財團法人義大醫院
	高雄市立大同醫院
	財團法人高雄醫學大學附設中和紀念醫院
	高雄榮民總醫院
	長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院
屏東縣	屏基醫療財團法人屏東基督教醫院
	安泰醫療社團法人安泰醫院
花蓮縣	財團法人花蓮佛教慈濟綜合醫院
	臺灣基督教門諾會醫療社團法人門諾醫院
台東縣	財團法人台灣基督教長老教會馬偕醫院臺東分院
金門縣	衛生福利部金門醫院